

Exercice 1 5 points – 0,5 point par questionCompléter **sur l'énoncé** par \in , \subset , \notin ou \nsubseteq .

$$2^{10} \in \mathbb{N} \quad 10^{-12} \notin \mathbb{Z} \quad \sqrt{\frac{81}{100}} \in \mathbb{Q} \quad \frac{\sqrt{36}}{2} \in \mathbb{N} \quad (-3)^7 \in \mathbb{Z} \quad 0 \notin \mathbb{N}^*$$

$$\sqrt{7} \in \mathbb{R} \quad \frac{2}{5} \in \mathbb{D} \quad \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \quad \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

Exercice 2 Les quatre questions sont indépendantes. 6 points1. Donner la définition de l'ensemble \mathbb{D} des décimaux. /0,5

$$\mathbb{D} = \left\{ \frac{n}{10^k} \text{ où } n \in \mathbb{Z} \text{ et } k \in \mathbb{N} \right\}$$

2. Donner la liste des 10 premiers nombres premiers. /0,5

$$2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29$$

3. Démontrer que si n est un entier pair alors $(n + 1)^2 + n + 1$ est pair. /2,5

Soit n un entier pair. Alors $n = 2k$ où $k \in \mathbb{Z}$. Donc $(n + 1)^2 + n + 1 = (2k + 1)^2 + 2k + 1 = 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 = 4k^2 + 6k + 2 = 2(2k^2 + 3k + 1) = 2p$ où $p \in \mathbb{Z}$. On conclut que $(n + 1)^2 + n + 1$ est pair.

4. a) Donner la définition d'une fraction irréductible. /0,5

Une fraction est dite irréductible lorsque le numérateur et le dénominateur n'ont pas de facteurs communs (autre que 1 ou -1).

b) Soit $A = \frac{8}{3} - \frac{5}{\frac{3}{20}}$. Calculer A sous la forme d'une fraction irréductible. /2

$$A = \frac{8}{3} - \frac{5}{\frac{3}{20}} = \frac{8}{3} - \frac{21}{12} = \frac{32 - 21}{12} = \boxed{\frac{11}{12}}$$

Exercice 3 4 points

Soit ABCD un parallélogramme. Les points E et F sont tels que :

$$\overrightarrow{BE} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{DF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{DA}$$

1. Exprimer le vecteur \overrightarrow{CE} en fonction des vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AD} . /1,5

$$\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BE} = \boxed{-\overrightarrow{AD} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}}$$

2. Exprimer le vecteur \overrightarrow{BF} en fonction des vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AD} . /1,5

$$\overrightarrow{BF} = \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DF} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} - \frac{1}{3}\overrightarrow{DA} = \boxed{\frac{4}{3}\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB}}$$

3. En déduire que les droites (CE) et (BF) sont parallèles. /1

On remarque que $-\frac{4}{3}\overrightarrow{CE} = -\frac{4}{3}\left(-\overrightarrow{AD} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AB}\right) = \frac{4}{3}\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BF}$ soit $\boxed{\overrightarrow{BF} = -\frac{4}{3}\overrightarrow{CE}}$.

Les vecteurs \overrightarrow{CE} et \overrightarrow{BF} sont colinéaires. Donc les droites (CE) et (BF) sont parallèles.

Exercice 4 5 pointsRésoudre les équations suivantes dans \mathbb{R} **en simplifiant au maximum les solutions** :

/1

$$(E_1) : \frac{1}{4}x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 16$$

$$S = \{-4; 4\}$$

/1,5

$$(E_2) : \frac{2x - 5}{2 - 4x} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow 4x - 10 = 6 - 12x \Leftrightarrow 16x = 16 \Leftrightarrow x = 1$$

$$S = \{1\}$$

/2,5

$$(E_3) : \frac{3x + 2}{4 + x} = \frac{4 + x}{3x + 2} \Leftrightarrow (3x + 2)^2 = (4 + x)^2 \Leftrightarrow (3x + 2)^2 - (4 + x)^2 = 0$$
$$\Leftrightarrow (3x + 2 - 4 - x)(3x + 2 + 4 + x) = 0 \Leftrightarrow (2x - 2)(4x + 6) = 0 \Leftrightarrow$$
$$2x - 2 = 0 \text{ ou } 4x + 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = 2 \text{ ou } 4x = -6 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ou } x = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}$$

$$S = \left\{1; -\frac{3}{2}\right\}$$